Melanorosauridae

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Melanorosauridae é uma família de dinossauros sauropodomorfos do clado Anchisauria que ocorreu do Triássico Superior ao Jurássico Inferior na África.

Nomenclatura e taxonomia

A família foi cunhada por Friedrich von Huene in 1929 e classificada no clado Prosauropoda.[1] Três gêneros são incluídos na família: *Camelotia*, *Lessemsaurus* e *Melanorosaurus*.[2]

Referências

1. von Huene, F. (1929). «Kurze Übersicht über die Saurischia und ihre natürlichen Zusammenhänge». *Paläontologische Zeitschrift*. **11**: 269-273
2. Galton, P.M.; Upchurch, P. (2004). «Prosauropoda». In: Weishampel, D.B.; Dodson, P.; Osmólska, H. (eds.). *The Dinosauria* 2 ed. Berkeley: University of California Press. pp. 232–258

Melanorosauridae

Ocorrência: Triássico-Jurássico: 228–189.6 Ma

Pre Є Є O S D C P T J K Pg N

Lessemsaurus sauropoides

Classificação científica

Reino:	Animalia
Filo:	Chordata
Clado:	Dinosauria
Ordem:	Saurischia
Subordem:	Sauropodomorpha
(sem classif.)	Anchisauria
Família:	**Melanorosauridae** von Huene, 1929

Gêneros

- *Camelotia*
- *Lessemsaurus*
- *Melanorosaurus*

Obtida de "https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Melanorosauridae&oldid=52651594"

Esta página foi editada pela última vez às 14h51min de 13 de julho de 2018.

Este texto é disponibilizado nos termos da licença Atribuição-CompartilhaIgual 3.0 Não Adaptada (CC BY-SA 3.0) da Creative Commons; pode estar sujeito a condições adicionais. Para mais detalhes, consulte as condições de utilização.